

外科	MSI-Highを有する固形癌	キイトルーダ療法
	胃癌	DOC療法
		SOX療法
		TS-1+CDDP+HER療法
		TS-1+DOC療法
		TS-1+高用量CDDP
		アブラキサン単独療法（3投1休）
		オプジーボ療法
		オプジーボ+mFOLFOX6(シニアフェザー・胃癌)
		オプジーボ+mFOLFOX6（通常・胃癌）
		オプジーボ+SOX療法（胃癌）
		オプジーボ+XELOX療法(胃癌)
		サイラムザ+パクリタキセル療法
		Cape+CDDP+HER療法
	食道がん	FP療法
		食道癌；アクトラ+フルオロウラシル
		DTX療法
	大腸がん	FOLFIRI+ザルトラップ療法（インフェザー）
		アービタックス+FOLFIRI(インフェザー)
		アービタックス単独療法
		アバスチン+FOLFIRI（シニアフェザー）
		アバスチン/CPT-11+TS-1（IRIS）4週1クール
		アバスチン+mFOLFOX6（シニアフェザー）
		SOX+BV療法
		アバスチン/CPT-11+XELODA(XELIRI)3週1クール
		XELOX+B V 療法
		サイラムザ + FOLFIRI療法（シニアフェザー）
		ベクティックス+CPT-11療法
		ベクティックス+FOLFIRI（シニアフェザー）
		ベクティックス+mFOLFOX6（シニアフェザー）
		ベクティックス（単独）
	膵臓がん	FOLFIRINOX（シニアフェザー）
		Gemzer療法
		アブラキサン+ゲムシチン療法
		オニバイド+5FU+LV療法（通常）
	胆道がん	GC(GEM+CDDP)
		GS(TS-1+GEM)療法
		FEC70-100(アロキシ)
		TC(DOC+CPA)療法
		VNR療法
		アバスチン+Weeklyパクリタキセル療法
		カドサイラ療法

	乳がん	パージェタ+ハーセプチン+ドセタキセル療法
		ハーセプチン+TC療法
		ハーセプチン療法
		VNB療法+ハーセプチン療法
		ハラヴェン療法
		ハーセプチン+3W DTX療法
肝臓内科	肝細胞癌	サイラムザ単独療法
		テセントリク+アバスチン併用療法
呼吸器外科	肺癌	2Wオプジーボ
		4Wオプジーボ
		6wキイトルーダ
		TS-1+CBDCA+BV療法
		アバステン(3W)+タルセバ
		アブラキサン単独
		アリムタ
		アリムタ+アバステン
		イミフィンジ
		カルセド
		カルボプラチン+アブラキサン
		カルボプラチン+アリムタ
		カルボプラチン+アリムタ+アバステン
		カルボプラチン+イリノテカン
		カルボプラチン+エトポシド療法
		3Wキイトルーダ
		キイトルーダ+カルボプラチン+アリムタ
		キイトルーダ+アリムタ(維持)
		キイトルーダ+カルボプラチン+アブラキサン療法
		キイトルーダ+カルボプラチン+アリムタ
		サイラムザ+ドセタキセル
		シスプラチン+イリノテカン
		シスプラチン+エトポシド
		テセントリク
		テセントリク+CBDCA+アブラキサン
		テセントリク+カルボプラチン+エトポシド
		テセントリク+カルボプラチン+エトポシド(維持)
		ドセタキセル
		ビノレルビン+シスプラチン
		ニボルマブ+イピリムマブ
	キャスルマン病 全身型若年性特発性関節炎	アクテムラ療法
	ベーチェット病による 難治性網膜ぶどう膜炎	レミケード療法

リウマチ内科	乾癬	レミケード療法
	若年性特発性関節炎	アクテムラ療法
	強直性脊椎炎	レミケード療法
	関節リウマチ	アクテムラ療法
		オレンシア療法
		レミケード療法
	全身性エリテマトーデス	ベンリスタ療法
リウマチ内科	多発血管炎性肉芽腫症 顕微鏡的多発血管炎	リツキシマブ療法
	腸管型ベーチェット病 神経型ベーチェット病 血管型ベーチェット病	レミケード療法
消化器内科	潰瘍性大腸炎	エンタイビオ療法
		レミケード療法
泌尿器科	前立腺がん	DP（DOC+PSL）療法
	膀胱がん	GC(GEM+CDDP)
	腎細胞がん	ニボルマブ+イピリムマブ療法

外科

MSI-Highを有する固形癌

レジメンセット名称	キイトルーダ療法	インターバル日数	3週間毎	適応	がん化学療法後に増悪した進行・再発の高頻度マイクロサテライト不安定性(MSI-High)を有する固形癌(標準的治療が困難な場合に限る)
-----------	----------	----------	------	----	---

[illegible]

胃がん

レジメンセット名称	DOC療法	インターバル日数	3週間毎	適応	再発・切除不能進行胃がん
-----------	-------	----------	------	----	--------------

[illegible]

レジメンセット名称	TS-1+高用量CDDP (アロキシ)	インターバル日数	TS-1 3週投与2週休薬 CDDP day8	適応	再発・切除不能進行胃がん
-----------	------------------------	----------	----------------------------	----	--------------

					Day																												
Rp.	薬品名	手技	投与ルート	点滴時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
	TS-1(内服)	分2	朝夕食後		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●								
Day 8																																	
1	ラクテックG輸液	点滴静注	末梢	2時間								↓																					
2	ソルデム3A輸液	点滴静注	末梢	2時間								↓																					
3	生食注	点滴静注	末梢	30分間								↓																					
	アロキシ注																																
	デキサート注																																
4	生食注	点滴静注	末梢	2時間								↓																					
	シスプラチン点滴静注液																																
5	ラクテックG輸液	点滴静注	末梢	2時間								↓																					
	ラシックス注																																
6	ソルデム3A輸液	点滴静注	末梢	2時間								↓																					
7	ラクテックG輸液	点滴静注	末梢	2時間								↓																					
	内服処方:必要に応じて デキサメサゾン(0.5) 2×MA												●	●	●																		

2週間休薬

2
週
間
休
薬

レジメンセット名称	アブラキサン 単独療法(3投1休)	インターバル日数	週1回投与を3週間連続 1コース	/	適応	胃癌
-----------	----------------------	----------	---------------------	---	----	----

[illegible]

レジメンセット名称	サイラムザ+パクリタキセル療法	インターバル日数	4週間(1コース)	適応	胃癌：治癒切除不能な進行・再発胃癌
-----------	-----------------	----------	-----------	----	-------------------

[illegible]

レジメンセット名称	Cape+CDDP+HER療法	インターバル日数	21日 (カペシタビン:2週投与1週休薬)	適応	HER2過剰発現の再発・切除不能進行胃がん
-----------	-----------------	----------	--------------------------	----	-----------------------

[illegible]

食道がん

レジメンセット名称	FP療法 (5-フルオウラシル・CDDP)	インターバル日数	5-フルオウラシル: DAY1-DAY5 CDDP: DAY1に投与し3週休薬	適応	遠隔転移を有する(M1)切除不能食道癌 あるいは術後再発食道癌
-----------	--------------------------	----------	--	----	------------------------------------

[illegible]

大腸がん

レジメンセット名称	FOLFIRI+ザルトラップ療法(インフューザー)	インターバル日数	2週間毎	適応	切除不能進行・再発の結腸・直腸癌
-----------	---------------------------	----------	------	----	------------------

[illegible]

レジメンセット名称	アービタックス＋FOLFIRI (インフューザー)	インターバル日数	アービタックス 1週間 FOLFIRI療法 2週間	適応	EGFR陽性の治癒切除不能な進行・再発の結腸・直腸癌
-----------	------------------------------	----------	------------------------------	----	----------------------------

Rp	薬品名	手技	投与ルート	点滴時間	Day																											
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	生食注	点滴静注	メイン	15分	↓								↓																			
	デキサート注射液																															
	ボラミン注射液																															
	1は2開始30～60分前より開始																															
2	生食注	点滴静注	メイン	初回 2時間 2回目以降 1時間	↓								↓																			
	アービタックス																															
3	生食注	点滴静注	メイン	30分間	↓																											
	グラニセトン 静注液																															
	デキサート注射液																															
4	5%ブドウ糖液	点滴静注	メイン	2時間	↓																											
	レボホリナート点滴静注																															
5	5%ブドウ糖液	点滴静注	サブ	2時間	↓																											
	イリノテカン注																															
6	生食注	静注	メイン	5分間	↓																											
	5-フルオロウラシル注																															
7	生食注	インフューザー	メイン	48時間	↓																											
	5-フルオロウラシル注																															
【悪心・嘔吐対策】(必要に応じて)																																
	内服処方: デカドロン錠 2×MA					●	●	●																								



レジメンセット名称	アバスチン/CPT-11+TS-1(IRIS)4 週1クール	インターバル日数	day1・15 CPT-11/アバスチン投与 + TS-1 14日間投与 14日間休薬	適応	切除不能進行・再発の大腸癌
-----------	-----------------------------------	----------	--	----	---------------

Rp.	薬品名	手技	投与ルート	点滴時間	Day																											
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	生食注	点滴静注	末梢	30分間	↓												↓															
	グラニセロン静注液																															
	デキサート注射液																															
2	生食注	点滴静注	CVポート	初回 90分 2回目 60分 3回目以降30分	↓												↓															
	アバスチン注射液																															
2	5%ブドウ糖液	点滴静注	末梢	90分間	↓												↓															
	イリノテカン注																															
3	生食注	点滴静注	フラッシュ用	全開	↓												↓															
4	TS-1	分2 朝夕食後			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	休薬期間														

レジメンセット名称	SOX+BV療法 (TS-1+オキサ プラチン アバスチン)	インターバル日数	オキサプラチン+BV 3週1回投与 + TS-1 14日間投与 7日間休薬	適応	切除不能進行・再発の大腸癌
-----------	-----------------------------------	----------	--	----	---------------

[illegible]

レジメンセット名称	アバスチン/CPT-11+XELODA (XELIRI)3週1クール	インターバル日数	day1 CPT-11/アバスチン投与 +カペシタビン 2週投与1週休薬	適応	切除不能進行・再発の大腸癌
-----------	---------------------------------------	----------	---	----	---------------

[illegible]

レジメンセット名称	サイラムザ+FOLFIRI療法 (シュアフューザー)	インターバル日数	2週間毎	適応	治癒切除不能な進行・再発の結腸・直腸癌
-----------	-------------------------------	----------	------	----	---------------------

[illegible]

レジメンセット名称	ヘクティックス+FOLFIRI (シュアフューザー)	インターバル日数	2週間毎	適応	切除不能進行・再発の結腸・直腸癌
-----------	-------------------------------	----------	------	----	------------------

[illegible]

レジメンセット名称	ヘクティベックス+mFOLFOX6 (シュアフューザー)	インターバル日数	2週間毎	適応	切除不能進行・再発の結腸・直腸癌
-----------	---------------------------------	----------	------	----	------------------

[illegible]

胆道がん

レジメンセット名称	GC(GEM+CDDP)	インターバル日数	3週間毎	適応	胆道癌
-----------	--------------	----------	------	----	-----

[illegible]

レジメンセット名称	GS(TS-1+GEM)療法 (2週投与1週休薬)	インターバル日数	1クール 21日間	適応	局所進行または転移性胆道癌
-----------	------------------------------	----------	-----------	----	---------------

[illegible]

乳がん

レジメンセット名称	FEC70-100(アロキン) (5-FU+ファルモルピシン+エンドキサン)	インターバル日数	3週間毎 4コース (day1,day22,day43,day64)	適応	乳癌：術前術後補助化学療法 進行・再発乳癌
-----------	---	----------	---------------------------------------	----	--------------------------

[illegible]

レジメンセット名称	TC(DOC+CPA)療法	インターバル日数	3週間毎 4コース	適応	乳癌：術前術後化学療法、転移・再発症例
-----------	---------------	----------	-----------	----	---------------------

[illegible]

膀胱がん

[illegible]

膵臓がん

レジメンセット名称	オニバイド+5FU+LV 療法(通常)	インターバル日数	2週間毎	適応	がん化学療法後に増悪した治癒切除不能な膵癌
-----------	------------------------	----------	------	----	-----------------------

[illegible]

肝臓内科

肝細胞癌

レジメンセット名称	サイラムザ単独療法	インターバル日数	2週間	適応	がん化学療法後に増悪した血清AFP値が400ng/mL以上の切除不能な肝細胞癌
-----------	-----------	----------	-----	----	---

[illegible]

呼吸器外科

肺癌

レジメンセット名称	オプジーボ	インターバル日数	2週間毎	適応	切除不能な進行・再発の非小細胞肺がん がん化学療法後に増悪した切除不能な進行・再発の悪性胸膜中皮腫
-----------	-------	----------	------	----	--

[illegible]

レジメンセット名称	6wキイトルーダ400mg	インターバル日数	6週間毎	適応	PD-L1陽性の切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌
-----------	---------------	----------	------	----	---------------------------

[illegible]

レジメンセット名称	TS-1+CBDCA+BV療法	インターバル日数	3週間毎	適応	非小細胞肺癌
-----------	-----------------	----------	------	----	--------

Rp.	薬品名	手技	投与ルート	点滴時間	Day																											
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	生食	点滴静注		30分	↓																											
	グラニセトロン注				↓																											
	デキサート注				↓																											
2	生食	点滴静注		1時間30分	↓																											
	カルボプラチン注				↓																											
3	生食	点滴静注		1回目90分	↓																											
	ベバシズマブ			2回目60分	↓																											
				3回目以降30分																												
4	生食	点滴静注		30分	↓																											
5	エスワンタイホウ配合OD錠	体表面積	朝夕 分2		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	休	休	休	休	休	休	休						
		2週投与1週休薬																														

レジメンセット名称	アバスチン(3W)+タルセバ	インターバル日数	3週間	適応	非小細胞肺癌
-----------	----------------	----------	-----	----	--------

					Day																											
Rp.	薬品名	手技	投与ルート	点滴時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	生食	点滴静注	1回目 90分		↓																											
	アバスチン		2回目 60分		↓																											
			3回目以降30分																													
2	生食	点滴静注		10分	↓																											
	タルセバ内服	食事の1時間以上前又は食事の2時間以降に1日1回経口投与																														

レジメンセット名称	アブラキサン単独	インターバル日数	週1回投与を3週間連続/1コース	適応	非小細胞肺癌
-----------	----------	----------	------------------	----	--------

					Day																											
Rp.	薬品名	手技	投与ルート	点滴時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	生食	点滴静注		5分	↓							↓							↓													
	デキサート注射液																															
2	生食	フラッシュ用		5分	↓							↓							↓													
3	生食	点滴静注(シリンジポンプ)		30分	↓							↓							↓													
	(血)アブラキサン																															
4	生食	点滴静注		5分	↓							↓							↓													

レジメンセット名称	アリムタ	インターバル日数	21日間	適応	非小細胞肺癌
-----------	------	----------	------	----	--------

					Day																											
Rp.	薬品名	手技	投与ルート	点滴時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	生食	点滴静注		30分	↓																											
	グラニセトロン静注液																															
	デキサート注射液																															
2	生食	点滴静注		10分	↓																											
	アリムタ注																															
3	生食	点滴静注		15分	↓																											

レジメンセット名称	アリムタ+アバスチン	インターバル日数	21日間	適応	非小細胞肺癌
-----------	------------	----------	------	----	--------

				Day																												
Rp.	薬品名	手技	投与ルート	点滴時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	生食	点滴静注		30分	↓																											
	グラニセトロン注																															
	デキサート注																															
2	生食	点滴静注		10分	↓																											
	アリムタ注																															
4	生食	点滴静注		1回目90分	↓																											
	アバスチン注			2回目60分																												
				3回目以降30分																												
5	生食	点滴静注		30分	↓																											

レジメンセット名称	イミフィンジ	インターバル日数	2週間	適応	切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌における 根治的化学放射線療法後の維持療法
-----------	--------	----------	-----	----	---

[illegible]

レジメンセット名称	カルセド	インターバル日数	3日間連日投与後、 3～4週間毎	適応	小細胞肺癌・非小細胞肺癌
-----------	------	----------	---------------------	----	--------------

					Day																											
Rp.	薬品名	手技	投与ルート	点滴時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	5%ブドウ糖	点滴静注	メイン	90分	↓	↓	↓																									
2	生食	点滴静注	側管	30分	↓	↓	↓																									
	グラニセトロン静注液																															
	デキサート注																															
3	生食	点滴静注	側管	5分	↓	↓	↓																									
	カルセド注																															

レジメンセット名称	カルボプラチン+アリムタ	インターバル日数	21日間	適応	非小細胞肺癌
-----------	--------------	----------	------	----	--------

					Day																											
Rp.	薬品名	手技	投与ルート	点滴時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	生食	点滴静注		30分	↓																											
	グラニセトロン静注液																															
	デキサート注射液																															
2	生食	点滴静注		10分	↓																											
	アリムタ注																															
3	生食	点滴静注		60分	↓																											
	カルボプラチン注																															
4	生食	点滴静注		15分	↓																											

レジメンセット名称	カルボプラチン+アリムタ+アバスチン	インターバル日数	21日間	適応	非小細胞肺癌
-----------	--------------------	----------	------	----	--------

Rp.	薬品名	手技	投与ルート	点滴時間	Day																											
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	生食	点滴静注		30分	↓																											
	グラニセトロン静注液																															
	デキサート注																															
2	生食	点滴静注		10分	↓																											
	アリムタ注																															
3	生食	点滴静注		60分	↓																											
	カルボプラチン注																															
4	生食	点滴静注		1回目90分	↓																											
	アバスチン注			2回目60分																												
				3回目以降30分																												
5	生食	点滴静注		15分	↓																											

レジメンセット名称	カルボプラチン+イリノテカン	インターバル日数	4週間毎	適応	小細胞肺癌
-----------	----------------	----------	------	----	-------

[illegible]

レジメンセット名称	キイトルーダ+カルボプラチン+アリムタ	インターバル日数	3週間毎	適応	非小細胞肺癌
-----------	---------------------	----------	------	----	--------

Rp.	薬品名	手技	投与ルート	点滴時間	Day																											
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	生食	点滴静注		15分	↓																											
2	生食	点滴静注		30分	↓																											
	キイトルーダ注																															
3	生食	点滴静注		15分	↓																											
4	生食	点滴静注		30分	↓																											
	グラニセトロン静注液																															
	デキサート注射液																															
5	生食	点滴静注		10分	↓																											
	アリムタ注																															
6	生食	点滴静注		60分	↓																											
	カルボプラチン注																															
7	生食	点滴静注		15分	↓																											

レジメンセット名称	キイトルーダ+アリムタ(維持)	インターバル日数	3週間毎	適応	非小細胞肺癌
-----------	-----------------	----------	------	----	--------

Rp.	薬品名	手技	投与ルート	点滴時間	Day																											
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	生食	点滴静注		15分	↓																											
2	生食	点滴静注		30分	↓																											
	キイトルーダ注																															
3	生食	点滴静注		15分	↓																											
4	生食	点滴静注		30分	↓																											
	グラニセトロン静注液																															
	デキサート注射液																															
5	生食	点滴静注		10分	↓																											
	アリムタ注																															
7	生食	点滴静注		15分	↓																											

レジメンセット名称	キイトルーダ+カルボプラチン+アブラキサン療法	インターバル日数	3週間毎	適応	非小細胞肺癌
-----------	-------------------------	----------	------	----	--------

					Day																													
Rp.	薬品名	手技	投与ルート	点滴時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
1	生食	点滴静注		15分	↓																													
2	生食 キイトルーダ注	点滴静注		30分	↓																													
3	生食	点滴静注		15分	↓																													
4	生食	点滴静注		30分	↓																													
	アロキシ																																	
	デキサート注射液																																	
5	生食	フラッシュ用		5分	↓																													
6	生食 (血)アブラキサン	点滴静注 (シリンジ・ポンプ)		30分	↓																													
7	生食	フラッシュ用		5分	↓																													
8	5%ブドウ糖 カルボプラチン	点滴静注		1時間	↓																													
9	生食	点滴静注		15分	↓																													
10	生食	点滴静注		5分								↓							↓															
	デキサート注射液																																	
11	生食	点滴静注		5分								↓							↓															
12	生食	点滴静注 (シリンジ・ポンプ)		30分								↓							↓															
	(血)アブラキサン																																	
13	生食	点滴静注		5分								↓							↓															

レジメンセット名称	キイトルーダ+カルボプラチン+アリムタ	インターバル日数	3週間毎	適応	非小細胞肺癌
-----------	---------------------	----------	------	----	--------

Rp.	薬品名	手技	投与ルート	点滴時間	Day																											
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	生食	点滴静注		15分	↓																											
2	生食	点滴静注		30分	↓																											
	キイトルーダ注																															
3	生食	点滴静注		15分	↓																											
4	生食	点滴静注		30分	↓																											
	グラニセトロン静注液																															
	デキサート注射液																															
5	生食	点滴静注		10分	↓																											
	アリムタ注																															
6	生食	点滴静注		60分	↓																											
	カルボプラチン注																															
7	生食	点滴静注		15分	↓																											

レジメンセット名称	シスプラチン+イリノテカン	インターバル日数	4週毎	適応	小細胞肺癌
-----------	---------------	----------	-----	----	-------

[illegible]

レジメンセット名称	シスプラチン+エトポシド	インターバル日数	3週間毎	適応	小細胞肺癌
-----------	--------------	----------	------	----	-------

[illegible]

レジメンセット名称	テセントリク	インターバル日数	3週間毎	適応	切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌
-----------	--------	----------	------	----	-------------------

[illegible]

レジメンセット名称	テセントリク+CBDCA+アブラキサン	インターバル日数	3週間毎	適応	非小細胞肺癌
-----------	---------------------	----------	------	----	--------

				Day																											
Rp.	薬品名	手技	点滴時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	生食	点滴静注	15分	↓																											
2	生食	点滴静注	初回60分 2回目以降 30分で投与可	↓																											
	テセントリク注																														
3	生食	点滴静注	15分	↓																											
4	生食	点滴静注	30分	↓																											
	グラニセトロン																														
	デキサート注射液																														
5	生食	フラッシュ用	5分	↓																											
6	生食	点滴静注 (シリンジポンプ)	30分	↓																											
	(血)アブラキサン																														
7	生食	フラッシュ用	5分	↓																											
8	5%ブドウ糖	点滴静注	1時間	↓																											
	カルボプラチン																														
9	生食	点滴静注	15分	↓																											
10	生食	点滴静注	5分								↓							↓													
	デキサート注射液																														
11	生食	点滴静注	5分								↓							↓													
12	生食	点滴静注 (シリンジポンプ)	30分								↓							↓													
	(血)アブラキサン																														
13	生食	点滴静注	5分								↓							↓													

レジメンセット名称	ビノレルビン+シスプラチン	インターバル日数	DAY1・8(VNRのみ)投与 DAY15は休薬	適応	非小細胞肺癌
-----------	---------------	----------	-----------------------------	----	--------

[illegible]

レジメンセット名称	ニボルマブ+イピリウムマブ療法	インターバル日数	6週間毎	適応	非小細胞肺癌・悪性胸膜中皮腫
-----------	-----------------	----------	------	----	----------------

					Day																											
Rp.	薬品名	手技	投与ルート	点滴時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	生食	点滴静注	末梢	15分	↓																					↓						
3	生食	点滴静注	末梢	30分	↓																					↓						
	オブジーボ注360mg																															
4	生食(観察期間)	点滴静注	末梢	30分	↓																											
5	生食	点滴静注	末梢	30分	↓																											
	ヤーボイ																															
6	生食	点滴静注	末梢	30分	↓																					↓						

リウマチ内科

キャッスルマン病・全身型若年性特発性関節炎

レジメンセット名称	アクテムラ療法	インターバル日数	2週間隔(症状により1週間まで投与間隔を短縮できる)	適応	キャッスルマン病/全身型若年性特発性関節炎
-----------	---------	----------	----------------------------	----	-----------------------

[illegible]

ベーチェット病による難治性網膜ぶどう膜炎

レジメンセット名称	レミケード療法 (インフリキシマブBS療法)	インターバル日数	初回投与後、2週、6週 に投与し以後8週間隔	適応	ベーチェット病による難治性網膜ぶどう膜炎
-----------	---------------------------	----------	---------------------------	----	----------------------

[illegible]

乾癬

レジメンセット名称	レミケード療法 (インフリキシマブBS療法)	インターバル日数	初回投与後、2週、6週に投与し、 以後8週間の間隔で投与	適応	尋常性乾癬、関節症性乾癬、膿疱性乾癬
-----------	---------------------------	----------	---------------------------------	----	--------------------

[illegible]

若年性特発性関節炎

レジメンセット名称	アクテムラ療法	インターバル日数	4週間隔	適応	関節リウマチ/多関節に活動性を有する若年性特発性関節炎
-----------	---------	----------	------	----	-----------------------------

[illegible]

強直性脊椎炎

レジメンセット名称	レミケード療法	インターバル日数	初回投与後、2週、6週に投与し、以後6～8週間の間隔で投与	適応	強直性脊椎炎
-----------	---------	----------	-------------------------------	----	--------

[illegible]

関節リウマチ

レジメンセット名称	アクテムラ療法	インターバル日数	4週間隔	適応	関節リウマチ/多関節に活動性を有する若年性特発性関節炎
-----------	---------	----------	------	----	-----------------------------

[illegible]

全身性エリテマトーデス

レジメンセット名称	ベンリスタ療法	インターバル日数	初回投与後, 2 週, 4 週に投与し 以後4 週間間隔 (d1 d15 d29)	適応	既存治療で効果不十分な全身性エリテマトーデス
-----------	---------	----------	--	----	------------------------

[illegible]

多發血管炎性肉芽腫症・顯微鏡的多發血管炎

レジメンセット名称	リツキシマブ療法	インターバル日数	1週間	適応	多発血管炎性肉芽腫症・顕微鏡的多発血管炎
-----------	----------	----------	-----	----	----------------------

[illegible]

腸管型ベーチェット病、神経型ベーチェット病、血管型ベーチェット病

レジメンセット名称	レミケード療法	インターバル日数	(初回投与後、2週、6週に投与し以後8週間隔)	適応	腸管型ベーチェット病、神経型ベーチェット病、血管型ベーチェット病
-----------	---------	----------	-------------------------	----	----------------------------------

[illegible]

消化器内科

潰瘍性大腸炎

レジメンセット名称	エンタイビオ療法	インターバル日数	初回投与後、2週、6週に投与し、以降8週間隔（d1、d15、d43）	適応	中等症から重症の潰瘍性大腸炎の治療及び維持療法（既存治療で効果不十分な場合に限る）
-----------	----------	----------	------------------------------------	----	---

[illegible]

泌尿器科

前立腺がん

レジメンセット名称	DP(DOC+PSL)療法	インターバル日数	3週間	適応	転移性・ホルモン不応性前立腺がん
-----------	---------------	----------	-----	----	------------------

[illegible]

膀胱がん

レジメンセット名称	GC(GEM+CDDP)	インターバル日数	4週間	適応	膀胱がん
-----------	--------------	----------	-----	----	------

[illegible]

[illegible]